

シングリックス®の取り扱いを 開始しました

帯状疱疹発症予防のためのワクチンです。

これまで水痘ワクチンが使用されていましたが、より発症予防・発症後の神経痛の軽減効果が高いものとなります。

対象者；50歳以上

水痘の予防効果はありません

比較

特徴	ビゲン 弱毒化生ワクチン 発症予防50%	シングリックス 不活化ワクチン 発症予防；50歳以上97%・70歳以上90%
効果	帯状疱疹後神経痛50%軽減	帯状疱疹後神経痛85%以上軽減
		2回接種することで十分な予防効果が得られます
接種回数	1回	2回(接種間隔；2か月、遅くとも6か月まで)
接種部位	皮下	筋肉
価格	7000円(税別) 注射部分の痛みと腫れ	1回20000円(税別) 【2回接種が必要】 注射部分の痛みと腫れ
副反応	倦怠感・頭痛・発熱など	筋肉痛・倦怠感・頭痛・発熱など ！！シングリックスの方がやや副反応強い！！
持続期間	症状は3日～1週間以内 5年程度	症状は3日～1週間程度 9年以上
利点	価格が安い 副反応が少ない	効果が高い
欠点	予防効果はシングリックスに比べると劣る	価格が高い 2回接種が必要・注射部分の腫れが強い

いずれも事前予約制です。
ご予約をご希望されるかたは
受付へお申し出ください。